



El gobierno de la ciudad realizará la "Campaña de vacunación en colonias de verano 2020" del 6 al 29 de enero. Se aplicarán las vacunas correspondientes para niños y niñas de 4, 5, 6 y 11 años.

Comenzará a partir del 6 de enero y se desarrollarán de 14:00 a 16:00 hs. pasando por diferentes polideportivos de la Ciudad. Se aplicarán las vacunas correspondientes a niños y niñas de 4, 5, 6 y 11 años.

Cronograma con fechas de vacunación en cada colonia:

Polideportivo Pereyra

6 de enero

Av. Vélez Sarsfield 1271

Club de Amigos

7 de enero

Av. Pres. Figueroa Alcorta 3885

Polideportivo Dorrego

8 de enero

Lisandro de la Torre y Monte

Polideportivo Martin Fierro

9 de enero

Oruro 1310

Polideportivo Colegiales

13 de enero

Freire 234

Polideportivo Patricios

14 de enero

Pepiri 135

Parque Manuel Belgrano (ex KDT)

15 de enero

Salguero 3450

Polideportivo Fátima

16 de enero

Ana María Janer 3351

Polideportivo Costa Rica

17 de enero

Chorroarin y Constituyentes

Polideportivo Chacabuco

20 de enero

Av. Eva Perón 1410

Parque Sarmiento

21 de enero

Av. R. Balbín 4750

Polideportivo Avellaneda

27 de enero

Lacarra 1257

Polideportivo Santojanni

28 de enero

Patrón 6222

Polideportivo Pomar

29 de enero

Mercedes 1300

Información de vacunas que se aplicarán:

La vacunación es una de las medidas más eficaces para la prevención de las enfermedades. Es muy importante estar al día con todas las vacunas para la protección individual y colectiva.

Niños de 5-6 años

1) Poliomielitis oral (Sabin)

En el Calendario Nacional de Vacunación está indicada: a los 6 meses de edad, y refuerzos a los 15-18 meses y a los 5 años de edad. Se administra por vía oral.

Es una vacuna muy segura y raramente produce efectos adversos.

2) Triple Viral - 2º dosis (sarampión, rubéola, paperas)

En el Calendario Nacional está indicada al año de vida y un refuerzo a los 5 años. Se administra subcutánea en región deltoides. Es una vacuna segura y muy efectiva.

Pueden aparecer entre 1 a 2 semanas después a la vacunación, en un bajo porcentaje de vacunados: fiebre, catarros de vías aéreas, y erupciones cutáneas de corta duración.

3) Triple Bacteriana Celular - 2º refuerzo DTP (difteria, tétanos, tos convulsa)

Se Indica como refuerzo a los 5 años, una sola dosis.

Se administra intramuscular en región deltoides.

Puede provocar dolor e hinchazón local dentro de las 48 horas de aplicada.

Estrategia adicional de Sarampión

Todos los niños de 13 meses a 4 años inclusive, deben acreditar al menos dos dosis de vacuna Triple Viral aplicadas a partir del año de vida.

Entran todos los niños que no entraron a la campaña por edad o que quedaron sin vacunar durante la misma.

Niños de 11 años

¿Hace falta vacunar a los niños a los 11 años?

Si, para reforzar la inmunidad contra esas enfermedades. Con los años, las defensas desarrolladas luego de las primeras dosis disminuyen. La protección obtenida puede perderse y el niño está expuesto a enfermarse y también contagiar a sus compañeros.

1) Triple bacteriana acelular DTP (difteria, tétanos, tos convulsa)

Es una vacuna de refuerzo. Puede producir dolor e hinchazón en el sitio de aplicación.

2) VPH (virus de papiloma humano)

Para las chicas nacidas a partir del 2000 para los chicos nacidos a partir del 2006. Es una vacuna muy segura y eficaz para la protección del cáncer de útero y para la prevención de verrugas y otros tipos de cáncer.

Se administra con un esquema de 2 dosis, con un intervalo de 6 meses entre ambas dosis. Sin la segunda dosis no hay protección, por eso es importante completar el esquema. En niñas mayores de 14 años son 3 dosis 0-2-6 meses. Puede producir dolor e hinchazón en el sitio de aplicación.

¿Qué pasa si un niño tiene atraso en las vacunas?

No importa la edad actual, solo hay que concurrir para ponerse al día con las dosis faltantes.